

等 別：高等考試
類 科：臨床心理師
科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。

一、大部分精神分裂症患者發病期間可以分成那幾期，而每一期的症狀有那些？(10 分)

二、對自閉症 (autistic disorder) 與阿茲海默症 (dementia of the Alzheimer's type) 患者的行為治療 (behavioral intervention)，其目標與方式各自為何？舉例說明並比較兩者行為治療的相同和相異處。(15 分)

三、認知治療 (cognitive therapy) 適合處置躁鬱症 (bipolar disorder) 患者躁期的何種臨床特徵或症狀？舉例說明其進行方式，並簡述相關認知取向 (cognitive approach) 病理與治療原理。(25 分)

乙、測驗題部分：

代號：5113

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 下列有關對立型反抗疾患的敘述，何者錯誤？

- (A)會侵入他人住宅偷竊 (B)常發脾氣
(C)常故意激惹他人 (D)至少會延續出現六個月的違拗行為

2 引發失智症 (dementia) 最常見的疾病是：

- (A)帕金森氏症 (Parkinson's disease) (B)中風
(C)愛滋病 (D)阿茲海默症 (Alzheimer's disease)

3 下列對失憶症臨床症狀的敘述，何者錯誤？

- (A)可能發生在物質使用後的持續效應所造成 (B)發生的早期不會有虛談現象 (confabulation)
(C)失憶的現象主要是失去時間定向性，而非自知力 (D)嚴重失憶症者會否認自己的失憶障礙

4 Alogia 的臨床特徵為缺乏下列何者？

- (A)智能 (B)有意義的語言表達 (C)情慾反應 (D)能量與興趣

5 精神分裂症患者所表現出的 flat affect，指的是：

- (A)不能表達情緒 (B)不能經驗到情緒
(C)不能經驗到生理引發的情緒 (D)以上皆是

6 DSM-IV 對精神分裂症的診斷，下列何者為必要？

- (A)出現急性症狀 (B)有家族病史 (C)多巴胺分泌異常 (D)症狀出現至少六個月

- 7 為何自閉症的基因研究這麼不易做？
- (A)此疾患的人數非常少 (B)大部分自閉症者到了成年早期即死亡
(C)自閉症者家長很少會懷第二胎 (D)花費太高
- 8 電痙攣治療（electroconvulsive therapy）對精神分裂症的治療之所以被放棄，是因為：
- (A)倫理性議題 (B)只能降低負性症狀
(C)無效用 (D)藥物治療的效用與電痙攣治療類似，且成本較低
- 9 下列有關譫妄症之臨床特徵的敘述，何者錯誤？
- (A)兒童比成人較少出現譫妄 (B)兒童期的譫妄常會認為是不合作
(C)老年人是譫妄的高危險群 (D)年紀愈大，女性患有譫妄的比例愈高
- 10 下列有關譫妄症患者的敘述，何者錯誤？
- (A)常伴有睡眠週期障礙而致白天嗜睡夜晚失眠 (B)病情發展緩慢，同一天之內症狀少有起伏變化
(C)對周圍環境的認知減退，並會有注意力障礙 (D)在認知上的障礙可包括定向力障礙
- 11 大部分失智症患者會最先發生下列何種狀況？
- (A)失用症（apraxia） (B)失語症（aphasia）
(C)記憶損害（memory impairment） (D)失認症（agnosia）
- 12 下列有關失智症之早發型與晚發型的敘述，何者正確？
- (A)早發型與晚發型是以 55 歲當作分野 (B)只有早發型失智症會伴隨有譫妄
(C)只有晚發型失智症會伴隨有譫妄 (D)早發型與晚發型兩者可能都會伴隨憂鬱心情
- 13 下列有關失智症患者臨床診斷的敘述，何者錯誤？
- (A)必須有認知功能障礙
(B)認知功能的障礙必須包括失語症、失用症、失認症和執行功能不良等四項
(C)認知功能的障礙必須包括失語症、失用症、失認症和執行功能不良等任一項
(D)認知功能的障礙是逐步退化的
- 14 下列有關譫妄症患者在認知能力之臨床表現的敘述，何者正確？
- (A)注意力降低 (B)定向力尚保留
(C)短期記憶保留，長期記憶正常 (D)語言表達不佳，但語言理解正常
- 15 下列有關 Rett 氏疾患（Rett's disorder）的敘述，何者錯誤？
- (A)屬於廣泛性的發展障礙
(B)出生前與出生時的發育即不正常
(C)可能在出生後 10 個月開始，頭部生長開始減緩
(D)可能在出生後 12 個月開始，漸失去有目的之手技巧
- 16 下列有關兒童期崩解症（childhood disintegrative disorder）的敘述，何者錯誤？
- (A)出生後至少前四年發展正常 (B)在八歲時語言及社會能力明顯喪失
(C)在五歲時大小便控制、運動能力明顯喪失 (D)有社會互動和溝通的障礙

- 17 關於學習障礙的治療，下列何者較恰當？
- (A)大部分伴有 ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)，因此要服用 Ritalin (methylphenidate)
(B)研究認為，必須依賴感覺統合治療
(C)對會讀錯字、表錯意者，必須加強音韻覺識的能力
(D)對會讀錯字、表錯意者，必須加強視覺空間的能力
- 18 以 DSM-IV 來看 ADHD 的盛行率研究，下列敘述何者正確？
- (A)全世界不同國家的資料看來，平均約 3 ~ 5%
(B)全世界不同國家的資料看來，無法說出一個具體數據
(C)中國低於美國
(D)印度低於美國
- 19 環境中的鉛中毒，可能會對兒童造成下列何種疾患？
- (A) ADHD (B)智能不足 (C)自閉症 (D)品行障礙
- 20 自閉症患者若接受標準的智能測驗，其分數多半會落在下列那一範圍？
- (A) <70 (B) 70 ~ 90 (C) 90 ~ 110 (D) >110
- 21 Eugen Bleuler 認為下列何者是精神分裂症的基本特徵？
- (A) progressive deterioration (B) disregard for reality (C) loose association (D) hallucination
- 22 被判定為中度智能不足的成年人，他們應可具備下列何種能力？
- (A)在督導下可以工作 (B)能正常的獨自工作
(C)仍需要持續長期的照護 (D)逐漸退化，失去功能
- 23 在 1980 年代以前，自閉症曾被誤認為是下列何種疾病或狀況？
- (A)學習障礙 (B)精神分裂症 (C)智能不足 (D)品行障礙
- 24 患者發生精神分裂症的症狀持續了 5 個月，按照 DSM-IV-TR 的標準，此時應歸類為下列那一種情況？
- (A) schizophrenia (B) schizophreniform disorder
(C) schizotypal personality disorder (D) brief psychotic disorder
- 25 大部分 ADHD 患童可以藉由一些治療方法或措施得到幫助，下列何者不屬這些治療方法？
- (A)中樞神經興奮劑 (B)特殊教學課程 (C)飲食控制 (D)優良的學習環境
- 26 下列為對立型反抗疾患的症狀，何者除外？
- (A)偷竊 (B)拒絕遵從指令 (C)經常懷恨 (D)易責怪他人
- 27 在藥物濫用與品行障礙之間的關聯，下列何者正確？
- (A)只出現在女性 (B)只出現在男性
(C)已知出現在男性，女性部分尚未有研究資料 (D)在男性和女性皆會出現
- 28 根據 DSM-IV-TR，下列何者不是自閉症的診斷標準？
- (A)缺少自動與他人分享物品或共同活動 (B)缺少社交或情緒上的互動
(C)不善言談而愛用手勢來補充意見的表達 (D)對某些物品或事情呈現異常的熱衷
- 29 對品行障礙最有用的治療模式是：

- (A)藥物 (B)減敏感法 (C)司法的保護管束措施 (D)父母管教訓練
- 30 下列那個腦區域，可以說是精神分裂症患者最可能發展異常的區域？
(A)邊緣系統和前額葉 (B)顳葉和頂葉
(C)杏仁核和胼胝體 (D)整個腦的區域都廣泛損傷
- 31 有 ADHD 病史的青少年會比一般青少年較常出現下列症狀，但何者除外？
(A)容易分心 (B)煩躁不安 (C)打斷他人說話 (D)沈默寡言
- 32 失智症患者會出現一些異常的神經精神症狀，但下列何者較不屬於失智症相關的症狀？
(A)妄想與幻覺 (B)使用粗魯猥褻的言詞 (C)不合理的情緒爆發 (D)癲癇發作
- 33 已被放棄用作治療精神病的腦葉切開術 (lobotomy) 在精神病治療史上曾有一段輝煌的時期，請問這項手術是要切開患者腦部的那一部分？
(A)胼胝體 (B)邊緣系統
(C)連接額葉與其下方結構間的神經路徑 (D)枕葉與頂葉之間的連結路徑
- 34 僵直型精神分裂症最顯著的症狀是涉及下列何項功能？
(A)思考形式 (B)動作功能 (C)注意力和知覺 (D)情感表達
- 35 「當我想要靜下來讀書，我發現我父親將他的思考直接傳入我的腦袋，讓我根本不能專心讀書。」若這是一位精神分裂症患者表達的感受，此應歸類為何種症狀？
(A)正性症狀 (positive symptoms) (B)負性症狀 (negative symptoms)
(C)情感 (D)無從判斷
- 36 精神病的社會選擇理論 (social selection theory) 認為：
(A)貧窮引發精神分裂症 (B)精神分裂症引發貧窮
(C)貧窮和精神分裂症無關 (D)社會階層區分同時引發精神分裂症與貧窮
- 37 下列有關精神分裂症多巴胺理論 (dopamine theory) 的敘述，何者錯誤？
(A)精神分裂症與腦部多巴胺活性過高有關
(B)多巴胺接受器 (receptor) 過多與精神分裂症的正性症狀有關
(C)額葉前部的大腦皮質 (prefrontal cortex) 多巴胺神經細胞活性不足與精神分裂症的負性症狀有關
(D)所有以多巴胺為神經介質 (neurotransmitter) 的腦內神經路徑對精神分裂症的發生均具有相同的重要性
- 38 大明是一名精神分裂症患者，目前與父母親同住，他父親常抱怨必須經常提醒他去洗澡或換衣服，不然他極少會去做。大明的表徵是符合下列何種狀況？
(A) anhedonia (B) avolition (C) asociality (D) alogia
- 39 下列疾病中，何者不是造成失智症的原因？
(A)哈丁頓氏舞蹈症 (Huntington's chorea) (B)常壓性水腦 (normal pressure hydrocephalus)
(C)吉伯特氏病 (Gilbert's disease) (D)神經梅毒 (neurosyphilis)
- 40 下列為說明精神分裂症患者家庭角色扮演的意義之模式，何者獲得研究上的支持？
(A) expressed emotion (B) labeling theory
(C) triangulation theory (D) schizophrenogenic mother