

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學總論(二) (包括心理衡鑑、心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、當你接到殘障鑑定轉介單，要求進行智能評估時，你如何進行心理衡鑑？如果你使用的是魏氏系列智力測驗，你的解釋策略如何進行？(15 分)
- 二、你接到一個重度智能不足個案，有嚴重的自傷行為(例如咬嘴唇、戳眼睛等)，你如何進行行為衡鑑與行為治療？(25 分)
- 三、在你進行心理衡鑑之前，你會如何決定使用那一種或那一些心理測驗？(10 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：3302

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 一般來說，當經驗逐漸增加之後，臨床工作者對自己的判斷愈有信心，其判斷為正確的機會：
(A)愈高 (B)愈低 (C)兩者沒有關係 (D)關係不確定
- 2 以精神分裂症來說，下列何種情境有最大的基準率 (base rate)？
(A)精神科門診 (B)地區醫院內科門診 (C)社區心理衛生中心門診 (D)學校
- 3 一般來說，在以晤談為衡鑑方法時月暈效應 (halo effect) 對於效度與評分者間信度的影響是：
(A)主要影響信度 (B)主要影響效度 (C)對信效度都很有影響 (D)對信效度影響都不大
- 4 設計和評估任何教育計畫都應注意下列各個部分及其相互間的影響情形，但不包括何者？
(A)教育官員的要求 (B)兒童的能力 (C)兒童的性格 (D)老師的特質
- 5 下列何者不屬於非結構式晤談常見的缺點？
(A)月暈效應 (B)驗證式偏誤 (C)初始印象效應 (D)太耗時
- 6 與傳統衡鑑比較起來，行為衡鑑顯得比較：
(A)直接、功利、以及功能取向 (B)重視理論、具體、以及實用取向
(C)重視正式內在特質、簡單、以及持久性 (D)便宜、有效、以及可應用性
- 7 在 WAIS 中，下列何者與其他選項顯然屬於不同類別？
(A) similarity (B) digit span (C) block design (D) comprehension
- 8 在 Rorschach 反應中，一般成人的 W : D 約略接近：
(A) 1 : 2 (B) 1 : 1 (C) 2 : 1 (D) 3 : 1

- 9 TAT 是根據下列何人之理論發展而來的？
(A) Freud (B) Murray (C) Erickson (D) Jung
- 10 在班達測驗的 1 號圖，其內容是由何種圖形所構成：
(A)一個大圓形和一個菱形 (B)很多小圓點 (C)主要是幾個三角形 (D)正方形
- 11 在臨床心理衡鑑報告的（解釋）討論部分，通常首先處理的是下列何者？
(A)智能因素 (B)生物因素 (C)發展因素 (D)人際關係
- 12 在 Reitan 的 Finger Tapping Test 中要求受測人用手指輕敲桌面，通常一次測試要敲多久？
(A) 10 秒 (B) 15 秒 (C) 30 秒 (D) 60 秒
- 13 柯永河(1977)曾以台大注意力測驗比較常人、官能症患者以及精神病患者，結果發現：
(A)精神病組的 E 分數最高 (B)官能症組的 O 分數最高
(C)正常人組的 t 最大 (D) c/t 的分數以正常人組最高
- 14 柯永河(1978)在心理診斷一書中曾表示晤談與晤談之間至少相隔多久？
(A) 10 分鐘 (B) 15 分鐘 (C) 30 分鐘 (D) 60 分鐘
- 15 根據 Mahler 的理論，個體的 separation and individuation 最後一個階段約完成於幾歲時？
(A) 2.5 至 3 歲 (B) 4.5 至 5 歲 (C) 11 至 13 歲 (D)沒有終期
- 16 Heinz Khout 在治療處理上，特別把重心放在自戀和邊緣型性格異常上，一般而言，他常對病人有缺損的自我提供：
(A)深遠的建議 (B)及時可用的建議 (C)客體關係的分析性看法 (D)同理心與諒解
- 17 下列有關 Jung 對於功能(functions)的敘述，何者正確？
(A)思考和情感屬於理性功能 (B)思考和感覺屬於理性功能
(C)感覺和情感屬於非理性功能 (D)情感和直覺屬於非理性功能
- 18 Jung 把治療上的第一個階段稱為：
(A)接納 (B)宣洩 (C)診斷 (D)瞭解
- 19 阿德勒學派試圖建立一種尊重與互信的治療關係，因此他們特別重視：
(A)對病人的稱謂與用語 (B)對病人的非語言行為 (C)治療目標的設定問題 (D)同理心的恰當使用
- 20 以齊克果和尼采兩位存在主義的哲學家來說，雖然在很多方面他們的看法不同，但是在下列那項的看法卻是相同的？
(A)神學與人的意向性 (B)人的主觀性與非理性 (C)人類之理性與意志 (D)意識與神學
- 21 根據 May 的說法，存在主義學者整理出人的三種「存在」即：
(A)物質場、生物場、以及社會場 (B)生物場、社會場、以及靈魂場
(C)物質場、社會場、以及靈魂場 (D)生物場、社會場、以及自我場
- 22 當一個人覺察不到自己真實的願望時，Yalom 稱之為：
(A) interpersonal isolation (B) intrapersonal isolation (C) existential isolation (D) wishless isolation

- 23 對精神分析學家 Otto Rank 來說，治療的目標是：
- (A)讓案主能認識自己 (B)讓案主的潛意識浮現於意識中
(C)讓案主接受自己的獨特性與生活的責任 (D)讓案主能發揮自己的潛力更接近自我實現
- 24 對於 Carl Rogers 來說，治療目標是來自：
- (A)案主 (B)治療師 (C)案主與治療師兩人 (D)不一定來自何人
- 25 在擴展 Rogers 處理嚴重精神分裂症的工作上，Prouty (1990) 大量使用 basic reflections 的技術，但不包含對下列何者之 reflections？
- (A) word (B) body movement (C) feeling (D) thinking
- 26 下列有關同理心對於心理治療的影響之研究發現，何者明顯有誤？
- (A)在治療中，案主對於同理心的感受往往與研究者的判斷不相同
(B)在治療中，案主對於同理心的界定往往與治療者的不盡相同
(C)在治療中，不同類型案主對於同理心的感受方式可能很不相同
(D)在治療中，不同案主的信念系統對於同理心感受的影響很有限
- 27 在 Gestalt 治療理論中，X 是關係的基本單位；而 X 被定義成 the experience of the boundary between “me” and “not me”。前述之 X 所指為何？
- (A)界限 (B)接觸 (C)觀念 (D)完形
- 28 下列選項何者最接近 Gestalt therapy 之治療目標：
- (A) self understanding (B) self integration (C) awareness (D) actualization
- 29 Behavior shaping 所使用的原理是下列何者？
- (A) Classical conditioning (B) Instrumental conditioning
(C) Social conditioning (D) Higher-level conditioning
- 30 有關 Albert Ellis 的 RET，從下列那一個面向觀察，則與 Rogers 的治療理論非常相近？
- (A) Unconditional positive regards (B) Empathy
(C) Genuineness (D) Open to experience
- 31 在有關認知治療的研究中，近年來下列何種問題有最多的研究論文？
- (A)憂鬱症 (B)焦慮症 (C)強迫症 (D)精神分裂症
- 32 下列有關 Reality Therapy (RT) 研究的敘述何者明顯有誤？
- (A)有關 RT 的研究以教育相關的議題為最多
(B)有研究發現 RT 對於男性少年犯罪者的治療效果不錯
(C) RT 可以增加案主對於內外控的區別感受
(D) RT 對於案主的潛意識處理有獨到的功能

33 在 Kanfer & Phillips 的行為治療之學習基礎一書中，不包括下列何者？

- (A) 刺激與反應之討論 (B) 有機體之生理與遺傳對行為之影響
(C) 觀察他人對行為可能之影響 (D) 行為反應的結果之變化對行為之影響

第 34 至 37 題使用下列圖表作答

甲乙丙丁為四種不同的衡鑑工具，其作為判別病人是否有病的情形如下：

工具別	判別	病人	非病人
甲	判定「有病」	85%	30%
	判定「正常」	15%	70%
乙	判定「有病」	75%	10%
	判定「正常」	25%	90%
丙	判定「有病」	65%	20%
	判定「正常」	35%	80%
丁	判定「有病」	95%	40%
	判定「正常」	5%	60%

34 【根據上列附表】工具甲的特異性 (specificity) 數值是：

- (A) 85% (B) 15% (C) 30% (D) 70%

35 【根據上列附表】若欲採用敏感性 (sensitivity) 最高的衡鑑工具則應該選取的是：

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

36 【根據上列附表】若某研究者欲在某大學篩檢該校學生是否「有病」，則何者可能是最佳選項？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

37 【根據上列附表】下列有關各工具之比較的論述，何者為真？

- (A) 甲比乙好 (B) 乙比丙好 (C) 丙比丁好 (D) 丁比甲好

38 下列有關神經心理衡鑑的描述，何者明顯有錯？

- (A) Luria 一派作法屬於病理癥兆徑路 (approach)
(B) Reitan 一派作法較常採用關鍵切割分數
(C) Reitan 一派的作法比 Luria 一派的更具彈性
(D) 兩種作法常常同時被使用於同一個臨床神經心理工作上

39 下列有關測驗信度的描述，何者明顯有錯？

- (A) 測驗題數較長的通常信度較高 (B) 二選一的測驗通常比多選一的信度高
(C) 整個測驗的信度通常高於分測驗的 (D) 測量標準誤的大小與信度大小的關係很緊密

40 Groth-Marnat 認為心理衡鑑最嚴重的缺失是：

- (A) 未能充分整合可用資料 (B) 對測驗結果解釋有偏差 (C) 收集資料太少 (D) 做過度的推論