

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、試述兒童與成人的創傷後壓力疾患 (Post-Traumatic Stress Disorder) 在臨床診斷上與心理治療上分別有那些異同點？(20 分)

二、試問精神分裂症 (Schizophrenia) 有那些亞型？在臨床心理衡鑑上，進行鑑別診斷時需注意那些要項？臨床上各亞型需如何考量心理治療法的選擇？(20 分)

三、試述臨床上應如何診斷自閉症 (Autistic Disorder) 兒童？(10 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：5302

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 下列那一種症候群最不可能出現視幻覺的問題？

(A)重度 Alzheimer 型失智症

(B)物質誘發之失智症

(C)譫妄

(D)失憶症

2 引起失智症最常見的疾病是：

(A)腦血管疾病

(B)阿茲海默氏病 (Alzheimer's disease)

(C)帕金森氏病 (Parkinson's disease)

(D)愛滋病

3 以下有關憂鬱症與早期之 Alzheimer 症之臨床表現比較，何者為錯誤之描述？

(A)前者 60 歲以上或以下皆可能發病，後者大部分在 60 歲以上發病

(B)前者對抗憂鬱劑較有反應，後者對抗憂鬱劑較無反應

(C)前者沒有出現認知功能障礙，後者出現認知功能障礙

(D)前者發病前認知功能相對完好，後者發病前認知功能已逐漸退化

4 在 Alzheimer 型失智症候群中，下列那一症狀會先出現？

(A)認知障礙

(B)情緒控制

(C)行動控制

(D)缺乏動機

5 Alzheimer 型失智症的早期病徵是：

(A)身體一邊失去感覺與運動控制能力

(B)無法理解他人說的話

(C)記不得剛學過的東西

(D)意識不清

6 診斷為失智症的四種認知功能障礙，不包含下列那一項？

(A)失語症 (aphasia)

(B)失認症 (agnosia)

(C)執行功能障礙

(D)失讀症 (alexia)

7 在區分譫妄與失智症方面，下列何者敘述為真？

(A)譫妄的病程起伏較大

(B) Alzheimer 型失智症的病程起伏較大

(C)失智症多半是可以治癒的

(D)譫妄的病發多半為慢性的

- 8 下列何者是屬於 Alzheimer 型失智症 (dementia) 最可能的描述：
- (A) 大多數病患都有腦部萎縮 (B) 是受到 HIV 病毒的感染
(C) 因為腦血管病變所造成 (D) 病患在行動行為上的困難
- 9 譫妄 (delirium) 特徵是：
- (A) 主要以記憶損害在內的多重認知障礙 (B) 短期內發展出意識障礙及認知能力變化
(C) 有記憶損害但是沒有其他認知缺陷 (D) 以上皆非
- 10 下列何者是精神分裂症的正性症狀 (positive symptom) 向度：
- (A) 解構性向度 (B) 動機向度 (C) 自我向度 (D) 情感向度
- 11 僵直型精神分裂症最明顯的症狀在於那一領域的障礙？
- (A) 動作功能 (B) 思考形式 (C) 注意與知覺 (D) 情感
- 12 晚近有關精神分裂症的多巴胺理論強調的是：
- (A) 多巴胺的濃度 (B) 環境因素造成多巴胺的變化
(C) 區分大腦中不同的多巴胺神經傳導路徑 (D) 大腦中製造多巴胺的區域受損
- 13 遺傳基因對於精神分裂症的發展有何影響？下列敘述何者最為正確。
- (A) 精神分裂症幾乎都是由環境壓力造成 (B) 精神分裂症幾乎都是由遺傳基因造成
(C) 精神分裂症是來自問題家庭 (D) 精神分裂症是由遺傳基因與環境壓力共同影響
- 14 研究顯示高情感表達 (expressed emotion, EE) 與精神分裂症的復發有關，試問什麼是高情感表達？
- (A) 病患的家庭成員提供病患情緒的支持與鼓勵
(B) 病患的情緒穩定度
(C) 病患的家庭成員對於病患冷淡、不理睬、漠不關心的態度讓病患很生氣
(D) 病患的家人對於病患過度苛責又過度保護
- 15 對於雙極性疾患的男女兩性盛行率比較敘述何者為是？
- (A) 第一型雙極性疾患，男女兩性的罹患率大致相同 (B) 第一型雙極性疾患，男性的罹患率高於女性
(C) 第二型雙極性疾患，男女兩性的罹患率大致相同 (D) 第二型雙極性疾患，男性的罹患率高於女性
- 16 對於精神分裂症患者的行為治療研究發現：
- (A) 能緩和所有症狀 (B) 能降低藥物的副作用
(C) 沒有效果 (D) 能提高患者之社交技巧與日常生活技能
- 17 研究顯示電痙攣治療 (ECT) 對何種疾病最具有療效？
- (A) 解離症 (B) 轉化症 (C) 嚴重憂鬱症 (D) 妄想性疾患
- 18 情感性疾患的基因遺傳研究結果顯示：
- (A) 單極性與雙極性情感性疾患具有同樣強的遺傳傾向
(B) 單極性與雙極性情感性疾患皆與遺傳無關，而主要是由環境因素引發
(C) 遺傳因素對單極性情感性疾患的影響比雙極性情感性疾患重要
(D) 遺傳因素對雙極性情感性疾患的影響比單極性情感性疾患重要
- 19 下列那一種藥物最可能是用來治療雙極性疾患：
- (A) imipramine (B) lithium carbonate (C) MAO inhibitor (D) fluoxetine (Prozac)
- 20 重鬱發作之診斷，必須先排除：
- (A) 一般醫學狀況，如甲狀腺功能低下
(B) 物質濫用的直接生理效應，如酒精中毒或古柯鹼戒斷
(C) 藥物治療 (如類固醇) 的副作用
(D) 以上皆是

- 21 神經心理檢查的功用在於：
(A)鑑別診斷 (B)早期偵測大腦功能異常 (C)找出未受損之功能 (D)以上皆是
- 22 有關輕躁狂與躁狂發作之鑑別診斷的描述，下列何者為非：
(A)輕躁狂經常出現高昂與易怒心情間的轉換，但在躁狂發作並不常見
(B)輕躁狂尚未嚴重到造成社會職業功能的損壞
(C)輕躁狂不會出現妄想或幻覺的問題
(D)輕躁狂意念飛躍並不常見，縱使有也僅持續很短時間
- 23 相較於 Alzheimer 型失智症候群，血管性失智症候群：
(A)可能發生於腦血管病變之後 (B)為突然發作或階梯式惡化
(C)認知功能的障礙參差不齊 (D)以上皆是
- 24 小芳 15 歲，媽媽覺得他從小就太安靜而帶到醫院作檢查。檢查結果智商 65，無明顯適應行為的缺陷或損傷，其最可能的診斷為：
(A)輕度智能不足 (B)中度智能不足 (C)非智能不足 (D)選擇性緘默症
- 25 譫妄可能出現的知覺障礙形式是：
(A)錯誤闡釋 (misinterpretation) (B)錯覺
(C)幻覺 (D)以上皆是
- 26 以下針對閱讀疾患之描述何者為非：
(A)檢查閱讀疾患所使用的閱讀成就測驗，其內容應包括閱讀正確度、速度、與理解程度
(B)閱讀成就測驗需衡量患者之年齡、教育程度，但與智能無關
(C)早期發現早期處理，相當高比例的患者預後良好
(D)閱讀疾患可持續到成年期
- 27 由閱讀疾患之盛行率顯示，下列描述何者為非：
(A)有家族群聚現象
(B)女性高於男性
(C)伴隨閱讀疾患的學習疾患，佔全部學習障礙的八成
(D)常伴隨低自尊、及社交技巧缺陷
- 28 自閉症的溝通障礙診斷標準，包含下列那一項：
(A)視空間功能障礙 (B)遇到人常問為什麼
(C)語音辨識困難 (D)使用特異的字句 (idiosyncratic)
- 29 有關艾斯伯格症 (Asperger's disorder)，與自閉症疾患的差異比較，以下敘述何者為非？
(A)二者皆有社會互動障礙 (B)二者皆發展出侷限重複的行為、興趣、及活動
(C)二者皆是廣泛性發展障礙 (D)二者皆出現一般性語言發展遲緩
- 30 自閉症與精神分裂症的鑑別診斷，下列何者為是：
(A)兒童期初發的精神分裂症，通常在發作前已有數年正常功能發展
(B)精神分裂症男女罹患比例大致相當；自閉症男女罹患比例亦約為 1：1
(C)精神分裂症終生盛行率 0.5% - 1%；自閉症終生盛行率 0.2% - 0.5%
(D)以上皆是
- 31 注意力缺陷過動症 (ADHD) 的主要特徵為：
(A)反應抑制缺陷、衝動控制困難、延宕需求的能力不足
(B)對於有興趣的活動，注意力依然無法集中
(C)坐立難安的情況，不會隨著年齡降低
(D)病程短，到了成人就會改善，不會對生活造成損害

- 32 注意力缺陷過動症（ADHD）的病因包括：
- (A)遺傳基因 (B)胎兒暴露於酒精和菸
(C)出生後大腦前額葉受傷 (D)以上皆是
- 33 兒童期初發型品行疾患（conduct disorder）常被認為是在成人期出現的那一種疾患的前兆？
- (A)反社會人格疾患 (B)邊緣性人格疾患 (C)分裂性人格疾患 (D)躁鬱症
- 34 對於兒童期初發型與青春期初發型這兩種亞型的品行疾患（conduct disorder）患者的描述，下列何者有誤？
- (A)兒童期初發型在 10 歲之前即初發
(B)兒童期初發型男性比例較高
(C)青春期初發型容易持續品行疾患，及發展成反社會性人格疾患
(D)青春期初發型較少出現攻擊行為
- 35 下列那一品行疾患（conduct disorder）的病因理論，受到實徵資料的支持：
- (A)基因 (B)家庭 (C)社會認知發展 (D)以上皆是
- 36 下列憂鬱症兒童的相關敘述何者為真？
- (A)他們的問題通常不會表現出來 (B)通常伴隨有其他心理社會壓力
(C)他們自殺嘗試的比例較成人低 (D)相較於成人，容易出現早上起床時的憂鬱情緒
- 37 兒童憂鬱症的治療特色在於：
- (A)加入家庭與學校環境的處理
(B)重視環境壓力勝於個人的認知偏誤、期待、與歸因組型
(C)以上皆是
(D)以上皆非
- 38 智能不足的成因是多元的，以下敘述何者有誤？
- (A)輕度智能不足通常可以找出大腦的缺陷
(B)中度智能不足以上，大多有明顯生理成因
(C)生理成因包括基因染色體異常、隱性基因疾病、母體受病毒感染等
(D)唐氏症是病因之一
- 39 以下對於分離焦慮疾患（separation anxiety disorder）病童的描述，何者有誤？
- (A)多來自關係緊密的家庭
(B)常被描述成要求多、侵擾他人、需要時時刻刻關注
(C)很少作身體抱怨
(D)當離開家或主要照顧者時，會重複經驗過度的痛苦
- 40 對立反抗疾患（oppositional defiant disorder, ODD）相較於品行疾患（conduct disorder, CD），下列敘述何者有誤？
- (A)前者問題較不嚴重，不會嚴重侵犯他人權益與違反適齡的主要社會規範
(B)所有 ODD 的症狀在 CD 中都會出現
(C) CD 診斷排斥 ODD 診斷
(D) CD 為發展成 ODD 的前兆